

INGUIPIPA

IDENTITÉ : *Couratari pulchra* Sandw.

Famille des Lécythidacées


NOMS COMMERCIAUX OU VERNACULAIRES

- Inguipipa, Mahot cigare (Créole)
- Tauari (Vénézuéla, Brésil)
- Iengipipa (Suriname)

CARACTÉRISTIQUES

— Cime assez importante, formée de branches plus ou moins dressées à l'exception des inférieures qui sont parfois presque horizontales.

FEUILLES $\times 1/2$. Feuilles alternes, parfois groupées par 3 ou 4 au sommet des rameaux.



FRUIT $\times 1/2$.

— Fût cylindrique, droit, parfois légèrement bosselé dans la partie supérieure, pouvant atteindre 25 à 30 m de hauteur avec un diamètre moyen voisin de 80 cm.

— La base du tronc est munie de contreforts importants, s'élevant de 4 à 8 m de hauteur le long du tronc, aliformes à la base et se ramifiant avant d'atteindre le sol.

— L'écorce, finement fissurée dans le sens longitudinal, est relativement lisse avec par endroits des zones qui s'exfolient en écailles minces de forme variable. On note également la présence de petites lenticelles, alignées généralement dans le sens longitudinal.

— La teinte de l'écorce varie du gris au brun roux foncé.

— L'épaisseur de l'écorce morte, en dehors des zones écailleuses, se situe entre 1 et 2 mm.

— La partie vivante de l'écorce, blanc jaunâtre, épaisse de 8 à 12 mm est souple et fibreuse ; elle se détache facilement en longues lanières. Les indiens utilisent ces feuilletts très fins comme papier à cigarettes, d'où le nom d'Inguipipa (pipe des indiens) donné à l'arbre.

— Pas d'exsudation.

— Odeur légèrement nauséabonde.



Photo J. Thiel.

Couratari pulchra. Houppier




Photo J. Thiel.

Couratari pulchra. Base du tronc.

Couratari pulchra. Ecorce extérieure.

Photo J. Thiel.



Couratari pulchra. Entaille de l'écorce.

Photo J. Thiel.

