

# CÈDRE APICI

IDENTITÉ : *Ocotea* spp (sauf quelques espèces communes *O. rodiaei*, *O. rubra*, etc.)

Famille : Lauracées

## NOMS COMMERCIAUX ET VERNACULAIRES

- Cèdre noir (Créole)
- Bacika apici, Licanao apici (Paramaca)
- Pisi (Suriname)
- Dolly pear (Guyana)
- Louro branco, Louro inhamui (Brésil)
- Kereti, Silver Balli (Guyana)
- Laurel (Venezuela)
- Moena amarilla, Moena blanca (Pérou)
- Amarillo, Laurel (Colombie)
- Canelo amarillo, Figua amarillo, Tinchi (Equateur)
- Aguacatillo, Laurel (Amérique Centrale)

## CARACTÉRISTIQUES

— Cime assez importante, irrégulière, branches dressées ou obliques, branches basses presque horizontales, feuillage dense, vert foncé.

— Fût cylindrique, droit, pouvant atteindre 20 m de hauteur.

— Diamètre moyen, compris entre 60 et 70 cm, pouvant atteindre 80 cm.

— Contreforts s'élevant à 1,50 m avec une base de 60 à 90 cm et 7 à 10 cm d'épaisseur.


— L'écorce morte a un aspect superficiel brunâtre, grisâtre avec des taches verdâtres et noirâtres. Nombreuses lenticelles et bourrelets transversaux.

— L'écorce vivante est jaunâtre, mais vire au marron après la coupe.

— L'épaisseur de l'écorce varie de 6 à 18 mm.

— Pas d'exsudation.


— Odeur peu prononcée mais parfumée, caractéristique des Lauracées.



### Feuilles.

Feuilles simples, alternes, de diverses espèces d'*Ocotea*.

- 1) *O. guianensis* Aubl.
- 2) *O. nigra* R. Ben.
- 3) *O. oblonga* Mez.
- 4) *O. petalanchera* Mez.
- 5) *O. schomburgkiana* Benth. et Hook.



Fruit d'*Ocotea glomerata*.  
Echelle 1/1.



Photo D. Fouquet.

*Ocotea glomerata. Houppier.*



Photo D. Fouquet.

*Ocotea glomerata. Base du tronc.*

*Ocotea glomerata. Ecorce.*

Photo D. Fouquet.



*Ocotea glomerata. Entaille de l'écorce.*

Photo D. Fouquet.

