


COEUR DEHORS

IDENTITÉ : *Diploptropis purpurea* Amsh.

Famille des Fabacées (Papilionacées)

NOMS COMMERCIAUX OU VERNACULAIRES

- Cœur dehors (Créole)
- Baaka kiabici (Paramaka)
- Kiabici oudou (Saramaka)
- Swarte kabbes (Suriname)
- Tatabu (Guyana)
- Sucupira (Brésil, U.S.A.)
- Aji, Zapannegro, Alcornoque (Venezuela)



FEUILLE $\times 1/2$. Feuille composée.

FRUITS $\times 1/2$.

CARACTÉRISTIQUES

- Le Cœur dehors possède généralement un fût droit pouvant atteindre 15 à 20 m de hauteur, à section plus ou moins régulière.
- Le diamètre moyen se situe entre 40 et 60 cm, cependant certains sujets peuvent atteindre des diamètres beaucoup plus importants.
- La base du tronc est légèrement évasée. Pas de contreforts.
- Ecorce extérieure finement fissurée dans le sens longitudinal, de teinte générale gris brunâtre avec de nombreuses taches irrégulières blanchâtres, ocrées et verdâtres.
- Ecorce morte peu épaisse, de 1 à 1,5 mm, brunâtre.
- Ecorce vivante épaisse de 8 à 15 mm, granuleuse, cassante, de teinte orangéâtre parsemée de points blanchâtres, brunit rapidement après entaille.
- Pas d'exsudation.
- Odeur non définie.



Photo J. Thiel.

Diploptropis purpurea. Houppier.

Diploptropis purpurea. Ecorce.

Photo J. Thiel.




Photo J. Thiel.

Diploptropis purpurea. Base du tronc.

Diploptropis purpurea. Entaille de l'écorce.

Photo J. Thiel.

