

GRIGNON FRANC

IDENTITÉ : *Ocotea rubra* Mez.

Famille des Lauracées

NOMS COMMERCIAUX OU VERNACULAIRES

- Grignon franc, Grignon rouge (créole)
- Wana (Paramaka, Suriname)
- Achiamandola (Saramaka)
- Determa, Louro red (Guyana)
- Louro vermelho (Brésil)
- Tétérama (Arawak)

CARACTÉRISTIQUES



FEUILLES $\times 1/2$. Entières, alternes, coriaces, groupées à l'extrémité des rameaux.

FRUITS $\times 1/2$. La graine est noirâtre à maturité.

- Grand arbre pouvant atteindre 25 m de hauteur sous branches, droit, mais à section parfois irrégulière.
- Diamètre moyen : 0,50 à 1 m.
- Présence de contreforts arrondis, épais, ne s'élevant généralement pas très haut le long du fût.
- Le Grignon franc se reconnaît facilement par la présence de grandes écailles de dimensions et de formes variables qui s'exfolient en se soulevant par la base.
- La teinte extérieure de l'écorce est grise avec parfois des reflets rougeâtres.
- On note la présence de nombreuses lenticelles en relief.
- L'écorce morte est peu épaisse.
- L'écorce vivante est très épaisse (de 12 à 25 mm) de teinte rougeâtre avec de petites zones blanchâtres, cassante, plus ou moins fibreuse-granuleuse.
- Odeur très légère, rappelant un peu celle de la canne à sucre.
- Pas d'exsudation à l'entaille.



Photo J. Thiel.

Ocotea rubra. Fût caractéristique.





Photo J. Thiel.

Ocotea rubra. Base du tronc.

Ocotea rubra. Ecorce extérieure.

Photo J. Thiel.



Ocotea rubra. Entaille de l'écorce.

Photo J. Thiel.

