

SAINT MARTIN ROUGE

IDENTITÉ : *Andira coriacea* Pulle.

Famille des Fabacées (Papilionacées)

NOMS COMMERCIAUX OU VERNACULAIRES

- Saint Martin rouge, Angelin (Créole)
- Lebi kiabici (Paramaka)
- Kiabici oudou (Saramaka)
- Rodekabbes, Barakaro, Firiberoebana (Suriname)
- Kararo, Betseed, Partridge wood, wild olive, Red cabbage (Guyana)
- Andira jerena, Angelim (Brésil)
- Chigo, Chirai, Bilon (Venezuela)
- Moca blanco, Mocha colorado (Amérique centrale)

FEUILLE $\times 1/2$.
Feuille composée.



FRUITS $\times 1/2$.

CARACTÉRISTIQUES

- Houppier formé de grosses branches noueuses, ascendantes.
- Fût généralement bien conformé, droit, élancé, de 20 à 25 m de hauteur.
- Diamètre moyen de 0,60 à 0,80 m.
- Base du tronc cylindrique ou un peu évasée, absence de contrefort. On note parfois la présence de petites racines qui émergent du sol.
- Ecorce extérieure, gris brunâtre avec des taches blanchâtres, verdâtres ou ocrées, crevassée longitudinalement, s'exfoliant parfois par plaques de formes irrégulières de 1 à 5 mm d'épaisseur.
- Ecorce vivante, ocre orange, épaisse de 8 à 12 mm, dure, granuleuse, donnant une cassure nette.
- Odeur bien marquée de concombre.
- Pas d'exsudation immédiate, mais présence sur blessures anciennes de gomme gélatineuse brunâtre.



Photo J. Thiel.

Andira coriacea. Houppier.

Andira coriacea. Ecorce extérieure.

Photo J. Thiel.



Photo J. Thiel.

Andira coriacea. Base du tronc.

Andira coriacea. Entaille de l'écorce.

Photo J. Thiel.

