

BAGASSE

IDENTITÉ : *Bagassa tiliaefolia* R. Ben.

Famille des Moracées

NOMS COMMERCIAUX OU VERNACULAIRES

- Bagasse, Bois vache (Créole)
- Odon (Saramaka, Paramaka)
- Gèle bagasse (Suriname)
- Cow-wood (Guyana)
- Tatajuba, Amapá-Rana (Brésil)

CARACTÉRISTIQUES

— La cime est importante, de forme irrégulière, avec les feuilles groupées à l'extrémité des rameaux.

— Le fût est généralement de bonne conformation, son diamètre moyen se situe entre 75 et 95 centimètres.

— La base, sans contreforts, est évasée par le départ de grosses racines.

— L'écorce extérieure a une teinte gris-brun avec de nombreuses petites taches blanchâtres et verdâtres.

— L'écorce morte s'exfolie par petites écailles de consistance liégeuse.

— On note la présence de très nombreuses lenticelles brunes, de formes variées.


— La tranche de l'écorce est épaisse de 15 à 25 mm.

— L'écorce morte, de teinte brune, d'un centimètre environ d'épaisseur, a une section transversale irrégulière dans sa zone de contact avec l'écorce vivante.


— L'écorce vivante, de teinte ocre clair, est très lamelleuse, impossible à casser.

— A l'entaille, la section se trouve très rapidement recouverte par un latex blanc très poisseux.

— Odeur marquée mais non définie.



FEUILLES $\times 3/4$, simples, opposées, groupées sur les rameaux de l'année. On rencontre fréquemment deux types de feuilles sur le même rameau.



FRUIT $\times 1/4$, jaune orangé à maturité.




Photo J. Thiel.

Bagassa tiliaefolia. Houppier.





Photo J. Thiel.

Bagassa tiliaefolia. Base du tronc.

Bagassa tiliaefolia. Ecorce.

Photo J. Thiel.



Bagassa tiliaefolia. Entaille de l'écorce.

Photo J. Thiel.

