

BAGASSE

IDENTITÉ : *Bagassa tiliaefolia* R. Ben.

Famille des Moracées


NOMS COMMERCIAUX OU VERNACULAIRES

- Bagasse, Bois vache (Créole)
- Odon (Saramaka, Paramaka)
- Gèle bagasse (Suriname)
- Cow-wood (Guyana)
- Tatajuba, Amapá-Rana (Brésil)

CARACTÉRISTIQUES

- La cime est importante, de forme irrégulière, avec les feuilles groupées à l'extrémité des rameaux.

- Le fût est généralement de bonne conformation, son diamètre moyen se situe entre 75 et 95 centimètres.



- La base, sans contreforts, est évasée par le départ de grosses racines.
- L'écorce extérieure a une teinte gris-brun avec de nombreuses petites taches blanchâtres et verdâtres.
- L'écorce morte s'exfolie par petites écailles de consistance liégeuse.
- On note la présence de très nombreuses lenticelles brunes, de formes variées.
- La tranche de l'écorce est épaisse de 15 à 25 mm.
- L'écorce morte, de teinte brune, d'un centimètre environ d'épaisseur, a une section transversale irrégulière dans sa zone de contact avec l'écorce vivante.
- L'écorce vivante, de teinte ocre clair, est très lamelleuse, impossible à casser.
- A l'entaille, la section se trouve très rapidement recouverte par un latex blanc très poisseux.
- Odeur marquée mais non définie.

FEUILLES $\times 3/4$, simples, opposées, groupées sur les rameaux de l'année. On rencontre fréquemment deux types de feuilles sur le même rameau.



FRUIT $\times 1/4$, jaune orangé à maturité.



Photo J. Thiel.

Bagassa tiliaefolia. Houppier.



Photo J. Thiel.

Bagassa tiliaefolia. Base du tronc.

Bagassa tiliaefolia. Ecorce.

Photo J. Thiel.



Bagassa tiliaefolia. Entaille de l'écorce.

Photo J. Thiel.

