

ASSAO


IDENTITÉ : *Macrosamanea pedicellaris* Kleinh.

Famille des Mimosacées

NOMS COMMERCIAUX OU VERNACULAIRES

- Bois macaque, Bois la Morue, Bois pagode petites feuilles, Bougouni blanc (Créole)
- Assao (Paramaka, Saramaka)
- Tamalin, Bosh tamarinde, Pokronie (Suriname)
- Gambüi, Sobreiero, Jurema (Brésil)
- Manariballi (Guyana)

CARACTÉRISTIQUES



- Cime assez importante présentant des branches dressées à plus de 45° ; feuillage assez léger.
- Fût cylindrique, généralement droit dans la partie inférieure et parfois légèrement courbe dans la partie supérieure, pouvant atteindre 20 à 25 m de hauteur avec un diamètre moyen de 80 cm.
- Pas de contreforts, mais la base du tronc est généralement évasée.
- L'écorce présente un aspect caractéristique dû à l'exfoliation de petites écailles orbiculaires qui laissent en tombant une empreinte en creux de teinte orangée.
- La teinte générale de l'écorce varie du gris jaunâtre au brun orangé. Généralement la partie supérieure du tronc est plus claire que la base.
- L'écorce morte, de teinte rouge brique, est très fine (de l'ordre du millimètre). En grattant légèrement cette écorce, on découvre des zones irrégulières de teinte verdâtre.
- L'écorce vivante, de teinte jaune orange, a une épaisseur de 5 à 15 mm, elle est assez dure, granuleuse et cassante.
- A l'entaille, on note la présence d'une sève collante, jaune clair, transparente.
- Odeur particulière, difficile à définir. Dans son livre « Essences forestières de Guyane » (1960) Paul BENA signale une odeur de pâte fraîche (levain) que nous n'avons pas décelée.



Photo J. Thiel.

Macrosamanea pedicellaris. Houppier



Photo J. Thiel.

Macrosamanea pedicellaris. Base du tronc.

Macrosamanea pedicellaris. Ecorce extérieure.

Photo J. Thiel.



Macrosamanea pedicellaris. Entaille de l'écorce.

Photo J. Thiel.

