


PARCOURI

IDENTITÉ : *Platonia insignis* Mart.


Famille des Clusiacées

NOMS COMMERCIAUX OU VERNACULAIRES

- Parcouri, Parcouri jaune, Parcouri soufré (Créole)
- Mongo mataaki, Moussa fouka (Paramaka)
- Pakoelie, Matoumani (Saramaka)
- Pakoelie, Geelhart (Suriname)
- Pakuri, Mammea apple (Guyana)
- Pacuru, Ubucari, Bacuri (Brésil)
- Matazama (Equateur)
- Bacury (Paraguay)



FEUILLES × 1/2.



FRUIT × 1/2.
Jaune à maturité

CARACTÉRISTIQUES

- Cime importante à feuillage léger.
- Les branches de la base du houppier sont généralement horizontales.
- Fût cylindrique, droit, pouvant atteindre 25 m de hauteur avec un diamètre moyen compris entre 60 et 80 cm.
- La base du tronc ne possède pas de contreforts, on note seulement un léger évasement du pied.
- L'écorce est écaillée, plus ou moins profondément crevassée dans le sens longitudinal, de teinte générale brunâtre avec de petites zones grisâtres ou blanchâtres.
- L'écorce morte, de teinte marron terne, peut parfois atteindre 25 mm d'épaisseur. Cette épaisseur est variable suivant l'âge du sujet.
- L'écorce vivante est granuleuse, épaisse de 8 à 20 mm, elle laisse apparaître à l'entaille des zones blanches caractéristiques.
- L'incision de l'écorce laisse exsuder un suc résineux orangéâtre, celui-ci prend une teinte jaune soufre dans la zone proche de l'aubier. En vieillissant l'exsudation prend une teinte uniforme rouge-orange foncé.
- Pas d'odeur caractéristique.



Photo J. Thiel.

Platonia insignis. Houppier.



Photo J. Thiel.

Platonia insignis. Base du tronc.

Platonia insignis. Ecorce extérieure.

Photo J. Thiel.



Platonia insignis. Entaille de l'écorce.

Photo J. Thiel.

