

SIMAROUBA

IDENTITÉ : *Simarouba amara* Aublet.


Famille des Simaroubacées

NOMS COMMERCIAUX OU VERNACULAIRES

- Simarouba, Acajou blanc (Créole)
- Assoumaripa (Paramaka)
- Adonichi, Soemaroepa (Suriname)
- Simarupa (Guyana)
- Marupa (Brésil)
- Cedro blanco, Simaruba (Vénézuela)

CARACTÉRISTIQUES

- Cime d'importance variable à feuillage léger groupé au sommet des rameaux.
- Fût droit, cylindrique mais présentant parfois une section plus ou moins régulière.
- Le diamètre moyen se situe entre 50 et 60 cm.
- Pas de contreforts.
- L'écorce a une teinte générale gris-ocré, elle est finement striée dans le sens longitudinal. Sur les sujets âgés, ces petites stries deviennent des crevasses. Par endroits, l'écorce s'exfolie par petites plaques de forme irrégulière de 2 à 5 mm.
- La partie morte de l'écorce a une teinte brune assez terne, son épaisseur varie entre 2 et 6 mm.
- La zone qui sépare la partie vivante de la partie morte de l'écorce est jaunâtre avec des traces verdâtres sous les crevasses.
- La structure étagée du bois est assez bien visible à l'entaille de l'écorce.
- La partie vivante de l'écorce est granulo-fibreuse, jaune orangéâtre. Cette teinte s'atténue assez rapidement au contact de l'air.
- Pas d'exsudation.
- Odeur non définie.
- Saveur amère (l'écorce contient des substances toxiques, surtout dans les racines).



FEUILLE composée x 1/2.

FRUITS x 1/3.



Photo J. Thiel.

Simarouba amara. Houppier



Photo J. Thiel.

Simarouba amara. Base du tronc.

Simarouba amara. Ecorce extérieure.

Photo J. Thiel.



Simarouba amara. Entaille de l'écorce.

Photo J. Thiel.

