

SIMAROUBA


IDENTITÉ : *Simarouba amara* Aublet.

Famille des Simaroubacées

NOMS COMMERCIAUX OU VERNACULAIRES

- Simarouba, Acajou blanc (Créole)
- Assoumaripa (Paramaka)
- Adonichi, Soemaroepa (Suriname)
- Simarupa (Guyana)
- Marupa (Brésil)
- Cedro blanco, Simaruba (Vénézuéla)

CARACTÉRISTIQUES



- Cime d'importance variable à feuillage léger groupé au sommet des rameaux.
- Fût droit, cylindrique mais présentant parfois une section plus ou moins régulière.
- Le diamètre moyen se situe entre 50 et 60 cm.
- Pas de contreforts.
- L'écorce a une teinte générale gris-ocré, elle est finement striée dans le sens longitudinal. Sur les sujets âgés, ces petites stries deviennent des crevasses. Par endroits, l'écorce s'exfolie par petites plaques de forme irrégulière de 2 à 5 mm.
- La partie morte de l'écorce a une teinte brune assez terne, son épaisseur varie entre 2 et 6 mm.
- La zone qui sépare la partie vivante de la partie morte de l'écorce est jaunâtre avec des traces verdâtres sous les crevasses.
- La structure étagée du bois est assez bien visible à l'entaille de l'écorce.
- La partie vivante de l'écorce est granulo-fibreuse, jaune orangéâtre. Cette teinte s'atténue assez rapidement au contact de l'air.
- Pas d'exsudation.
- Odeur non définie.
- Saveur amère (l'écorce contient des substances toxiques, surtout dans les racines).




Photo J. Thiel.

Simarouba amara. Houppier




Photo J. Thiel.

Simarouba amara. Base du tronc.

Simarouba amara. Ecorce extérieure.

Photo J. Thiel.



Simarouba amara. Entaille de l'écorce.

Photo J. Thiel.

