


MAHOT ROUGE

IDENTITÉ : *Eschweilera amara* Ndz et autres espèces

Famille des Lecythidacées

NOMS VERNACULAIRES OU COMMERCIAUX

- Man Barklak (dénomination internationale).
- Mahot rouge (Créole).
- Lebi loabi (Paramaca et Boni).
- Inegosso (Saramaca).
- Tamoene (Surinam).
- Manbarlak, Idatimon, OeManbarkak (Suriname).
- Manbarklak (Venezuela).
- Toledo Wood, Makeralli, Wina Kakaralli (Guyana).
- Mata Mata, Jarana (Brésil).



CARACTÉRISTIQUES

Cime : arrondie ou parfois irrégulière, d'importance moyenne. Hauteur environ 1/3 du fût. Branches formant un angle de 45° avec le fût. Feuillage assez dense vert sombre.

Fût : cylindrique, droit, élargé, pouvant atteindre 20 mètres de long.

Diamètre : 50 à 60 cm en moyenne pouvant atteindre 80 cm.

Pas de contreforts.

Ecorce : aspect extérieur marron jaunâtre, fissures longitudinales à lèvres subéreuses, de 1 à 3 mm de profondeur, régulièrement réparties. Ecailles longitudinales de 4 mm d'épaisseur assez friables, lenticelles éparses.

Ecorce vivante : rose, fibreuse, élastique (3 à 4 mm d'épaisseur).

Odeur marquée non définie.

Pas d'exsudation.



Photo D. Fouquet.

Eschweilera amara. Houppier.

Eschweilera amara. Ecorce.

Photo D. Fouquet.



Photo D. Fouquet.

Eschweilera amara. Base du tronc.

Eschweilera amara. Entaille de l'écorce.

Photo D. Fouquet.

