


BALATA BLANC

IDENTITÉ : *Micropholis guianensis* Pierre
Micropholis venulosa Pierre

Famille des Sapotacées

NOMS COMMERCIAUX ET VERNACULAIRES

- Balata blanc (Créole)
- Bacouman (Paramaca)
- Maaka (Boni)
- Bouchi apa (Saramaca)
- Balata blanc (dénomination internationale)
- Morabali (Guyana)
- Suikerhout, Riemhout, Reini Lout (Suriname)
- Abiurana (nom. collect. de nombreux arbres de cette famille), Rosadinha (Brésil).



CARACTÉRISTIQUES

— Cime importante, assez arrondie, branches dressées à moins de 45°. Feuillage assez dense, verdâtre.

— Fût cylindrique, droit, élancé, pouvant atteindre 25 m de haut.

— Diamètre de 70 à 80 cm, pouvant atteindre 1 m.

— Contreforts importants, aliformes, 1 m de base jusqu'à 1,50 m de hauteur.

— L'écorce a un aspect grisâtre, noirâtre et des crevasses de 1 à 3 cm de profondeur, irrégulièrement espacées.

— L'écorce vivante a 8 à 9 mm d'épaisseur. Sa couleur rougeâtre brunit après la coupe.

— Exsudation d'un latex laiteux, très abondant.

— Odeur non définie.

Feuilles de Micropholis guianensis.




Photo Thiel.

Micropholis guianensis Pierre. *Houppier.*




Photo Thiel.

Micropholis guianensis. *Base du fût.*

Micropholis guianensis. *Ecorce.*

Photo Thiel.



Micropholis guianensis. *Entaille de l'écorce.*

Photo Thiel.

