

BALATA POMME

IDENTITÉ : *Ragala sanguinolenta* Pierre

Famille des Sapotacées

NOMS COMMERCIAUX ET VERNACULAIRES



- Balata pomme (Créole)
- Baaka messoupou (Boni)
- Suitamini (Paramaca)
- Swit'anini (Suriname)
- Barataballi (Guyana)

CARACTÉRISTIQUES

- Cime importante, branches très ramifiées, feuillage plutôt clair.
- Fût irrégulier, droit, pouvant atteindre 25 m de hauteur.
- Diamètre moyen compris entre 50 et 60 cm, pouvant cependant atteindre 1 m chez certains sujets.
- Les contreforts aliformes à crêtes arrondies peuvent monter à plus de 2 m avec une base de 2 m.
- L'écorce présente une teinte brun-grisâtre, ponctuée de taches marron clair dues aux exfoliations.

Lichens et mousses garnissent le tronc de taches jaunâtres et verdâtres.

- Crevasses réduites à de fines stries longitudinales plus ou moins localisées. Petites lenticelles marron clair surtout dans les dépressions laissées par les exfoliations.
- L'écorce vivante a 8 à 10 mm d'épaisseur. Elle est jaunâtre vers le rhytidome, rosâtre vers le liber. La texture est granuleuse.
- Exsudation assez abondante d'un liquide blanchâtre peu collant. Odeur et saveur peu définies.



Fruit, $\times 1/2$



Photo D. Fouquet.

Ragala sanguinolenta. Houppier.




Photo D. Fouquet.

Ragala sanguinolenta. Base du fût.

Ragala sanguinolenta. Ecorce.

Photo D. Fouquet.



Ragala sanguinolenta. Entaille de l'écorce.

Photo D. Fouquet.

