

SITUATION DES CULTURES FRUITIÈRES EN JUIN 1947

ALGÉRIE

I. — CLIMATOLOGIE

Temps sec et chaud, normal. Averses en Constantinois au début du mois. Rares vents chauds. Débit des puits anormalement bas.

II. — FIGUIERS

Les dokkars utilisés pour la caprification des Figuiers d'automne sont abondants dans la vallée de la Soumman (zone de production des Figues de Bougie).

III. — AGRUMES

Forte « chute de Juin ». La rareté des pluies de printemps n'a pas permis au sol des orangeries d'accumuler des réserves d'eau suffisantes, et l'action des vents chauds et des variations atmosphériques excessives du mois de Mai a été rendue ainsi extrêmement sensible. Malgré les irrigations, trop tardives en la circonstance, la chute de Juin est proportionnelle au déficit de pluviométrie des 3 dépar-

tements. Elle est par contre, limitée dans les cultures ayant reçu un complément d'eau par irrigation, au mois de mars.

Le deuxième épandage d'azote est en cours. L'entretien des orangeries marque un progrès sur l'an dernier en raison de l'amélioration des moyens de travail. Début des traitements aux huiles blanches.

Faible récolte de citrons d'été.

IV. — ARBRES A NOYAUX

La maturité marque comme au mois de Mai une avance d'une quinzaine de jours.

1^o **Abricotiers** : Prévisions confirmées.

Les « Rouge du Roussillon » sur le littoral constantinois sont parasités par la Ceratite — Blenheim, en Mitidja, est parasité le 15 juin.

Livraison aux marchés de consommation plus importante que l'an dernier.

2^o **Pruniers** : Récolte supérieure aux prévisions. Abondance de fruits petits. Transformation en alcool moins généralisée que l'an dernier. Le commerce préfère les fruits colorés.

3^o **Pêchers** : Bonne récolte en Constantinois allant en décroissant vers l'Algérois et l'Oranie.

V. — ARBRES A PÉPINS

Fortes attaques de Carpopapse en raison du défaut de traitements. Récolte abondante, très hative. Fin de la récolte de la pomme de Murcie (Oranie).

VI. — PÉPINIÈRES

Greffage des Agrumes. Les Bigaradiers se développent tardivement.

A. HAUVILLIE,

Ingénieur des Services Agricoles chargé de l'Arboriculture.

MAROC

GÉNÉRALITÉS

A part quelques journées de vent chaud qui ne semblent pas avoir provoqué de dommages, la température moyenne du mois de Juin est restée en général peu élevée.

Quelques précipitations ont été relevées accompagnées parfois de grêle.

AGRUMES

Dans la plupart des régions, des chutes de fruits importantes ont été signalées, notamment sur les

mandariniers et les clémentiniers. Pour ces derniers, la récolte s'annonçait cependant supérieure à celle de l'année dernière qui avait été particulièrement faible.

Les orangers auraient une récolte moyenne.

AMANDIERS

La récolte s'annonce variable suivant les régions. Assez faible pour celle de Meknès, elle reste bonne à Fès. Les amandes en vert continuent à être récoltées, mais arrivent en fin de saison.

VIGNES

Les raisins précoces : Kalili et Perle de Ksaba ont fait leur apparition sur les marchés. L'ensemble du vignoble est en bon état et il semble devoir fournir une abondante récolte. Les maladies cryptogamiques n'ont pas pris jusqu'ici un développement important.

Prunes, abricots et pêches continuent à arriver sur les marchés ainsi que quelques petits fruits comme framboises et fraises.

G. CUÉNOT,

Chef du Service de l'Horticulture.

TUNISIE

Le point le plus important à signaler nous semble le retard considérable des attaques de Cératite. Les premières ont eu lieu dans la région de Tunis vers le 23 Juin.

Dans cette même région, le 12 Juin une forte averse (12 à 22 mm suivant les stations) accompagnée de grêle, a causé dans les vergers quelques dégâts sans grande importance.

ABRICOTIERS

La récolte des variétés espagnoles a pu se terminer sans que les derniers fruits soient atteints par la Ceratite comme cela s'était produit les années

précédentes. Signalons une fois encore la fertilité de ces variétés et leur bonne tenue à la sécheresse. A Maknassy, notamment, sous une pluviométrie de l'ordre de 150 m depuis plusieurs années, ils ont une végétation remarquable.

AGRUMES

Très forte chute de fruits dans le centre de Bir Bou Rekba au Cap Bon. Chutes normales pour les autres régions de culture. Sur les clémentiniers, qui avaient abondamment fleuri et bien noué, la chute n'a pas été plus importante que sur les autres espèces. Dans la région de Nabeul, la végétation souffre du manque d'eau d'irrigation.

PÊCHERS

Production satisfaisante des Amsden dont la récolte est terminée. Très belle récolte des Michelin actuellement en cours. Entrée en production des Amiral Deway.

ARBRES A PÉPINS

Les variétés locales de pommes Bou Tabgaia, Aigre et Douce de Sfax, ainsi que les poires St-Jean, Wilder, Citron des Carmes arrivent sur nos marchés. Il semble que les dégâts du Carpopapse soient moins importants que les années précédentes.

J. PASQUIER,

Conseiller Agricole spécialisé en Horticulture

CAMEROUN (au 31 Mai 1947)

CLIMATOLOGIE

Quelques orages violents, mais dans la zone bananière, pluie peu abondante. Pas de dégâts dus à des tornades.

BANANIER

Éclaircissage et désherbage général dans toutes les plantations.

ÉTAT SANITAIRE GÉNÉRAL

Excellent, pas ou très peu de maladie de Sigatoka.

Les bananiers souffrent de la sécheresse, ce qui explique la diminution du poids moyen des régimes.

P. BERCHON,
(I.F.A.C.).