

DK 544819

SITUATION DES CULTURES FRUITIÈRES EN JUILLET 1947

MAROC

La température particulièrement douce pour la saison a été favorable à la végétation en général. Par contre, le développement des maladies cryptogamiques a été favorisé par un brouillard signalé dans diverses régions.

AGRUMES

La prochaine récolte s'annonce assez bonne dans l'ensemble du Maroc.

Dans la région de Meknès. — Les chutes de fruits ont cessé et suivant les prévisions, la récolte serait bonne pour les oranges, moyenne pour les mandarines et très faible pour les clémentines.

A signaler également les dégâts produits par une forte invasion de rats rongeur les pédicelles et faisant tomber les fruits.

Dans la région de Rabat (la plus importante au point de vue des agrumes). — La récolte qui s'annonçait très belle au début de la saison, a souffert des nombreuses chutes de fruits. Elle resterait cependant au moins égale à celle de la campagne précédente qui était moyenne.

La grosseur des fruits de certaines variétés précoces est remarquable pour la saison.

Les clémentiniers, sans donner partout une belle récolte, seraient plus chargés, en général, que

l'année dernière, mais en 1946 la production avait été particulièrement faible.

Cette remarque serait valable pour la région de Casablanca.

VIGNE

La végétation est bonne en général et, sauf imprévu, laisse supposer une récolte abondante. Les raisins précoces qui ont commencé à apparaître sur le marché au mois de Juin, continuent à arriver en assez grosse quantité.

CUÉNOT,

Chef du Service de l'Horticulture.

MARTINIQUE (30 Juin 1947)

La sécheresse signalée au cours du mois dernier s'est prolongée en Juin. Les quelques pluies tombées en Mai ont permis à la végétation de reverdir, mais cette poussée de sève a été de courte durée dans la presque totalité de l'île. La situation est donc assez mauvaise.

BANANIER

Dans certaines régions de l'île (le Nord et le Centre) les plantations de bananiers souffrent légèrement du manque d'eau. Les stipes se dessèchent et se coupent en leur milieu, les régimes n'arrivent pas à maturité et traînent par terre.

Les attaques de *Cercospora* se sont accentuées dans quelques plantations, les spores de ce champignon s'étant développées, au cours de Juin, dans de bonnes conditions. Les plantations attaquées se trouvent

généralement dans des endroits peu aérés et assez humides. La variété Poyo ou grande naine de la Montagne est souvent plus attaquée que les petites ou grandes naines.

ANANAS

La récolte d'ananas est terminée. Elle s'est effectuée dans de bonnes conditions. Tous les ananas récoltés ont été mis en conserves, la plus grande partie en tranches, le reste en sirop, en confitures ou marmelades et en jus. Il n'a pas été fait de mistelle d'ananas cette année.

De nouvelles plantations ont été faites utilisant tous les rejets et les couronnes disponibles. Un planteur nouveau doit faire venir ses plants de l'étranger (Porto-Rico). Les plantations effectuées dans le Sud (Au Marin) avec des Red Spanish sont

en bon état mais souffrent cependant de la sécheresse et ont, de ce fait, un certain retard. Toutes les plantations de Cayenne lisse sont en excellent état, sauf dans une propriété où l'on avait introduit des variétés Red Spanish de Porto-Rico qui avaient été arrachées après un dépérissement rapide. Les Cayennes lisses succédant à ces Red Spanish, souffrent du même mal. Le symptôme le plus prononcé est la pâleur progressive des feuilles précédée d'un rougissement initial, pâleur qui s'aggrave jusqu'à ce que les feuilles arrivent à un blanc jaunâtre. Les feuilles cessent de croître et commencent à mourir à partir de la pointe. La plante fructifie mal, le fruit est petit. Le système racinaire est peu développé.

H. GUYOT (I.F.A.C.).

MARTINIQUE (30 Juillet 1947)

La sécheresse prolongée s'est arrêtée au début du mois. On a enregistré 221 mm. à Fort-de-France, sur 25 jours de pluies, et 265 mm. à Sainte-Marie pour 21 jours. Ces précipitations sont venues à temps pour sauver le bétail. Les plantations avaient beaucoup souffert.

BANANES

Pendant le mois, le poids moyen des régimes exportés y compris leur emballage a été de 13 kg. 5, ce qui est satisfaisant pour la saison.

ANANAS

De nombreuses plantations de Red Spanish ont

été entreprises grâce à l'apport de 300.000 plants venant de Porto-Rico, dans les régions suivantes : St-Pierre, Morne-Rouge, Lorrain, Ste-Marie, Simon et Fort-de-France.

AGRUMES

Apparition des premières oranges sur les marchés.